



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Туляремия

Туляремия - это опасное инфекционное заболевание, относящееся к группе природноочаговых инфекций, вызываемое туляремиальным микробом. Основным источником являются больные животные, главным образом грызуны, которые выделяют возбудителя с мочой и испражнениями, загрязняя объекты внешней среды (воду, пищевые продукты, сено, солому, зерно и т.д.). Заражения происходят через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. Возбудитель туляремии устойчив во внешней среде. При низкой температуре сохраняется в воде до 2-4 месяцев, в зерне, соломе до 6 месяцев, в пищевых продуктах до 3-х месяцев. Туляремией болеют как сельские, так городские жители.

Основные пути заражения:

- при контакте с грызунами;
- при употреблении воды и пищевых продуктов, загрязненных выделениями грызунов;
- при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля при работе с сеном и зерном, инфицированными больными грызунами;
- при присасывании клещей, зараженных туляремиальным микробом.

Характеристика заболевания

От человека к человеку инфекция не передается. С момента заражения до начала заболевания проходит от 3 до 14 дней. Обычно заболевание начинается остро: озноб, резкое повышение температуры тела до 38-40 градусов, ломота во всем теле, слабость, головная боль, головокружение. Часто при туляремии увеличиваются подчелюстные, подмышечные, паховые лимфатические узлы - бубоны, которые достигают размера голубинового, гусиного яйца. Они очень медленно рассасываются или через 2-3 недели нагнаиваются и вскрываются, образуя долго незаживающий свищ. У некоторых больных может быть ангина, поражение глаз, очаговые воспалительные процессы в легких. Туляремия может протекать длительно до 1-2 месяцев, но заканчивается выздоровлением.

Меры по профилактике туляремии

Основное средство защиты людей - проведение профилактических прививок, в первую очередь сельским жителям, начиная с 7 лет, а также лицам, подвергающимся высокому риску заражения при осуществлении профессиональной деятельности (перевозка и хранение кормов, зерна, уход за сельскохозяйственными животными). Прививки проводятся 1 раз в 5 лет накожным способом. К другим важным средствам профилактики относятся:

1. Защита тела от присасывания клещей при посещении леса.
2. Соблюдение правил личной гигиены: мытье рук перед едой, хранение запасов продуктов питания и воды в недоступных для грызунов местах.
3. Нельзя пить воду из неизвестных источников. Срубы питьевых колодцев должны быть благоустроены: иметь поверхность без щелей, плотно закрываться крышками.
4. Ухаживая за животными и работая на огороде, необходимо использовать защитную одежду и перчатки.
5. Трупы грызунов нельзя брать голыми руками, их нужно сжигать или закапывать на глубину 0,5м.
6. Перед началом дачного сезона необходимо проводить проветривание, влажную уборку помещений и мытье посуды с применением мыльно-содовых растворов, просушивать одежду и постельные принадлежности.
7. Для предупреждения появления и обитания грызунов в строениях следует:
 - своевременно устранять разрушения в фундаменте, стенах, полах цементом или другими материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;
 - устанавливать на вентиляционных окнах сетки с размерами ячеек не более 10x10 мм;
 - своевременно проводить уборку помещений и территории, не допуская их захламления, загрязнения мусором и пищевыми отходами.
8. Проводить мероприятия по истреблению грызунов, обращаясь в специализированные дезинфекционные предприятия или своими силами, отлавливая грызунов в ловушки, капканы, раскладывая отравленные приманки, которые можно приобрести в торговой сети или в дезинфекционных предприятиях.

Соблюдая эти простые правила Вы можете защитить себя и своих близких от опасного заболевания - туляремии.